

Внимание!

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ

ГРИПП ПТИЦ!

СИМПТОМЫ

От заражения до появления первых клинических признаков болезни может пройти от 1 до 5 суток.

При остром течении отмечают:

- угнетенное состояние сонливость
- истечение тягучей слизи из клюва
- конъюнктивит
- отек гортани, цианоз (синюшность) гребня, бородачок и лап
- диарею



- повышение температуры тела
- отеки подкожной клетчатки в области головы, шеи, груди
- шаткость походки, судороги, парезы и параличи.
- У кур-несушек резко снижается продуктивность.

Смертность поголовья птицы может достигать 100%

Установлено, что некоторые вирусы гриппа А птиц способны инфицировать людей и вызывать у них болезнь различной степени тяжести вплоть до смертельной.

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения заноса заболевания требуется:

1

1. Не допускать контакта домашних птиц с дикими и синантропными птицами:

- обеспечить поение птиц, не допуская их к открытым водоемам, где останавливается дикая птица;
- обеспечить содержание птиц в условиях, исключающих контакт с дикими и синантропными птицами (безвыгульное содержание, ограждения из сетки, оборудование навесов, отлугивание и т.п.);
- запрещается отлов дикой водоплавающей птицы для содержания в личных хозяйствах;
- не допускать потрошение охотничьей дичи на территории дворов и скармливание отходов домашним животным;
- обеспечить изолированное хранение кормов в закрытом помещении с целью недопущения его контаминации экскрементами диких и синантропных птиц;
- организовать изолированное хранение инвентаря по уходу за домашними птицами, содержать его в чистоте;
- производить своевременную уборку дворовых территорий и загонов от мусора и продуктов жизнедеятельности птиц;
- кормление птиц осуществлять в помещении в целях недопущения россыпи кормов на выгуле и привлечения диких птиц.

2

2. Обеспечить раздельное содержание разных видов птиц.

3

3. Запрещено приобретение молодняка птицы и инкубационного яйца в местах несанкционированной торговли и без ветеринарных справок.

4

4. Не допускать посторонних лиц в места содержания домашней птицы.

5

5. Не допускать употребление в пищу и скармливание животным подозрительной в заболевании птицы.

6

6. Использование пуха и пера в быту допускается после термической обработки (ошпаривание).

7

7. Соблюдать правила личной гигиены: уход за птицей осуществлять в специальной одежде, мыть руки с мылом после ухода, потрошение производить в перчатках и т.п.


8

8. При первых признаках заболевания и аномального поведения птиц (отказ от корма и воды; взъерошенность оперения; опухание головы; изменение цвета гребня, бородачок и конечностей; нарушение координации движения; тремор; аномальная поза; помутнение роговицы глаз у водоплавающих птиц и др.) и случаях внезапного массового падежа необходимо немедленно обратиться в местную ветеринарную службу для выявления причин заболевания и недопущения эпизоотии.



Что такое ГРИПП ПТИЦ?

Грипп птиц – острая высокозаразная болезнь, характеризующаяся поражением респираторной и пищеварительной систем, большинства внутренних органов.



По вопросам профилактики и борьбы с заразными болезнями, обращаться к ветеринарным специалистам территориального отдела по Красносулинскому району в населенных пунктах или в территориальный отдел по Красносулинскому району ГБУ РО «Шахтинская межрайонная СБЖ» по адресу: г. Красный Сулин, ул. Московская, д. 24 тел. 5-29-45; 5-03-59; (код города 86367).; 89094091086